

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. [Maggiori informazioni](#)

Accetta



● SPECIALE CORONAVIRUS ●

Studi confermano che gli asintomatici trasmettono il virus

REDAZIONE NURSE TIMES - 11/06/2020


 ENTE NAZIONALE
 di PREVIDENZA
 e ASSISTENZA
 della PROFESSIONE
 INFERMIERISTICA

0

SHARES





Approssimativamente il 40-45% delle persone infette da Sars-CoV-2 risultano senza sintomi, suggerendo un elevato potenziale del virus di diffondersi nella popolazione in maniera silenziosa ed estesa. Sono queste le affermazioni del presidente della **Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta**. Fa riferimento alla pubblicazione sugli Annals of Internal Medicine di una revisione dei dati di 16 coorti che sintetizza le migliori evidenze disponibili sull'infezione asintomatica da Sars-CoV-2, compresa quella italiana di Vò Euganeo.

Cartabellotta commenta **le dichiarazioni del capo del team tecnico anti-Covid-19 dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)** Maria Van Kerkhove, secondo cui "è molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il coronavirus" (poi rettificata perchè riferita a un set di dati limitato". Cartabellotta dice (fonte DottNet): "I soggetti asintomatici possono trasmettere il virus per un periodo prolungato, verosimilmente anche maggiore di 14 giorni. Diversi studi dimostrano che soggetti asintomatici e sintomatici hanno una **carica virale** simile che non coincide con la trasmissibilità del virus, ancora non adeguatamente studiata".



"L'assenza di sintomi non equivale ad assenza di lesioni: infatti, nelle 2 coorti che hanno sottoposto alla Tac i soggetti inclusi (Diamond Princess, Corea del Sud), sono state rilevate negli asintomatici anomalie polmonari subcliniche di incerto significato che richiedono ulteriori studi. A causa dell'elevato rischio di diffusione silente da parte di soggetti asintomatici, è indispensabile estendere le strategie di testing alle persone senza sintomi".

In sostanza, spiega Cartabellotta, "le evidenze ad oggi disponibili dimostrano che la prevalenza dei soggetti asintomatici è un fattore rilevante nella diffusione del contagio da Sars-Cov-2".

#NurseTimes - Giornale di informazione Sanitaria

Clicca MI PIACE sulla nostra pagina:

<https://www.facebook.com/NurseTimes.NT/>

"Seguici sul canale Nurse Times":

